

养殖场 (7): 家禽

良好的环境 – 饲养密度

什么是饲养密度？

饲养密度是指为每个动物提供的空间量。



世界动物卫生组织（OIE）关于肉鸡饲养密度建议：

肉鸡的饲养密度应能使其获得饲料和水，并能正常移动和调整姿势。应该考虑以下因素：管理能力，环境条件，禽舍制度，生产系统，垫料质量，通风，生物安全策略，基因，年龄和体重。

(ANIMAL WELFARE AND BROILER CHICKEN PRODUCTION SYSTEMS, Article 7.10.1.)



需考虑的事情：

在考虑饲养密度时，要考虑动物预期的最大生长量。当雏鸡处于宰前体重时，要有足够的空间供雏鸡使用。



饲养密度和行为

在饲养密度较高的情况下，家禽的休息行为将受到干扰，并且会影响自然行为，例如整羽和地面啄食。

较高的饲养密度对鸡的福利产生不利影响。



肉鸡的需要

- 家禽可以自由的接近饲料和饮水，不会有竞争。
- 雏鸡不受阻碍地站立，转身，拍翅膀。
- 舍外饲养的鸡能够自由移动和觅食。
- 如果鸡因过度拥挤而不活跃，则饲养密度也会相应调整。

*ASEAN Good Animal Husbandry Practices (GAHP) Animal Welfare and Environmental Sustainability Module,
Layers, Broilers and Ducks*

建议饲养密度

- 不应低于30kg/m².
- 环境控制不好的禽舍饲养密度最低应为20-25 kg/m²

Refer to EU Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare for more information.



饲养密度的重要性



更高的饲养密度导致更多的乳房水疱，慢性皮炎，腿部问题，假性灼伤以及更高感染的可能性。

这些都影响生产力和动物福利。

谢谢

更多资料请登陆 www.animalwelfarestandards.org

